

silicolgel®

Koloidna silicijumova kiselina
za gastrointestinalne poremećaje

GEL ZA ORALNU PRIMENU



Za simptome Sindroma nervoznih creva (IBS) I za tretman

- Proliv
- Bol u trbuhu
- Nadutost
- Osećaj nelagodnosti u crevima
- Mučninu
- Gorušice
- Refluksa
- Povraćanja

Poremećaji sistema za varenje su najčešće uzrokovani iritansima, štetnim i toksičnim supstancama, kao i patogenima.

Kada je sistem za varenje izložen takvim supstancama i patogenima, može doći do poremećaja kao što su proliv, bolovi u trbuhu, nadutost, osećaj nelagodnosti u crevima i mučnine koji mogu biti simptomi sindroma nervoznih creva (IBS), a takođe i do gorušice, refluksa i povraćanja.

Kao rezultat toga sistem za varenje ne može normalno da funkcioniše, i stvara se fizička nelagodnost.

silicolgel sadrži silicijumovu kiselinu u koloidnom (visoko dispergovanom) i hidratisanom obliku.

Njegova prednost je u tome što silicijumova kiselina ima veliku i veoma reaktivnu površinu.

Kada se uzima oralno, **silicolgel** stvara zaštitni i umirujući sloj na sluznici želuca i creva.

Zahvaljujući adsorptivnim ili vezujućim svojstvima koloidne silicijumove kiseline, **silicolgel** fizički adsorbira ili vezuje za sebe većinu iritansa, štetnih i toksičnih supstanci kao i patogena.

Na ovaj način se neutrališe njihovo štetno dejstvo i omogućava prirodno uklanjanje iz organizma putem creva.

silicolgel može smanjiti višak želučane kiseline i vezati gasove, čime smanjuje nadutost.

Takođe može ublažiti slične simptome koji se javljaju u sistemu za varenje usled promene ishrane tokom putovanja ili na odmoru.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

- **Pre svake upotrebe dobro promućkajte bocu.**
- Uzimajte **silicolgel** sa razmakom od najmanje 1 sat pre ili 2 sata nakon uzimanja hrane ili oralnih lekova.

Za tretman poremećaja sistema za varenje, uzeti 1 supenu kašiku (15 mL) medicinskog sredstva **silicolgel** tri puta dnevno.

silicolgel se može uzeti nerazređen ili razređen s vodom.

Deca mlađa od 12 godina, trudnice, žene koje sumnjaju na trudnoću ili doji mle mogu uzimati **silicolgel** samo nakon konsultacije sa lekarom.

Nakon ublažavanja simptoma, tretman medicinskim sredstvom **silicolgel** može se nastaviti još nekoliko dana.

Kod hroničnih poremećaja, tretman treba da traje i do 4 nedelje.

Ako se akutni simptomi pogoršaju ili se nisu smanjili nakon tri dana uzimanja ovog medicinskog sredstva, obratite se lekaru.

U slučaju proliva, potrebno je nadoknaditi izgubljenu tečnost.

SASTAV:

100 mL gela silicijumove kiseline sadrži 3,5 g silicijum-dioksida.

Konzervansi: sorbinska kiselina (E 200), natrijum-benzoat (E 211).

NEŽELJENA DEJSTVA:

Nema poznatih neželjenih dejstava.

INTERAKCIJE:

silicolgel treba uzeti sa razmakom od najmanje 1 sat pre ili 2 sata nakon uzimanja oralnih lekova. U suprotnom, njihovo dejstvo može biti smanjeno usled vezivanja za silicijumovu kiselinu.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne upotrebljavajte **silicolgel** u slučaju preosetljivosti na bilo koji od sastojaka.

VAŽNO:

- Čuvati van vidokrug a i domašaja dece.
- Ne zamrzavati. Čuvati na temperaturi iznad 2 °C.
- Pre svake upotrebe dobro promućkajte bocu.
- Proizvod može sadržati natrijum-hlorid u tragovima koji se formira tokom proizvodnog procesa.
- Pre upotrebe ovog medicinskog sredstva pročitajte uputstvo za upotrebu.
- U slučaju pojave ozbiljnog neželjenog dejstva, prijavite incident ovlašćenom predstavniku proizvođača i/ili nadležnom regulatornom telu za medicinska sredstva u Vašoj zemlji.
- Ne koristiti ukoliko je boca oštećena.
- Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
- Nakon prvog otvaranja, koristiti najduže 3 meseca.
- Uklonite ovaj proizvod zajedno sa komunalnim otpadom, u skladu sa lokalnim propisima u vašoj zemlji.



VRSTA PROIZVODA:

Gel za oralnu primenu.

Bez glutena. Pogodan za vegetarijance i vegane.

SADRŽAJ:

Boca sa 200 mL ili 500 mL gela.

Proizvod je dostupan i u pojedinačnim kesicama, 12 x 15 mL.

DATUM REVIZIJE UPUTSTVA:

Maj, 2025.

PROIZVOĐAČ:

Silicol GmbH, Teltower Strasse 10,

33719 Bielefeld, Nemačka

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA I

DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

Salveo d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 3V,

sprat 7, Beograd-Noví Beograd

Broj rešenja o registraciji:

515-02-05259-23-004 od 15.12.2023.

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA U CRNOJ GORI:

Salveo CG d.o.o. Podgorica, Slovačka 117, Podgorica

Broj rešenja o registraciji:

2070/25/3166 - 10840 od 25.12.2025.

