

Tyrosur[®] Gel

Tyrosur[®] Gel, 1 mg/g, gel
tirotricin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut ili medicinska sestra.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitćete:

1. ŠTA JE LEK TYROSUR GEL I ČEMU JE NAMENJEN

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO PRIMENITE LEK TYROSUR GEL

3. KAKO SE PRIMENJUJE LEK TYROSUR GEL

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

5. KAKO ČUVATI LEK TYROSUR GEL

6. SADRŽAJ PAKOVANJA I OSTALE INFORMACIJE

1. ŠTA JE LEK TYROSUR GEL I ČEMU JE NAMENJEN

Lek Tyrosur Gel sadrži aktivnu supstancu tirotricin koja pripada grupi antibiotika za lokalnu primenu. Lek Tyrosur Gel se koristi za lečenje malih površinskih i umereno vlažnih rana kao što su razderotine, ogrebotine i oderotine, sa prisutnom superinfekcijom izazvanom bakterijskim uzročnicima osetljivim na tirotricin.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO PRIMENITE LEK TYROSUR GEL

Lek Tyrosur Gel ne smete primenjivati:

- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na tirotricin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

- na sluzokoži nosa.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Tyrosur Gel.

Poseban oprez je potreban prilikom nanošenja leka na predeo u blizini očiju. Lek ne sme doći u dodir sa očima. Ukoliko lek dođe u dodir sa očima može izazvati osećaj pečenja.

Drugi lekovi i lek Tyrosur Gel

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uticaj drugih lekova na dejstvo leka Tyrosur Gel nije poznat. Nije poznato da lek Tyrosur Gel utiče na dejstvo bilo kog drugog leka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Nisu dostupni podaci o bezbednosti primene leka Tyrosur Gel tokom trudnoće. Potencijalni rizik za ljude je nepoznat usled nedostatka studija na životinjama. Zbog toga se ne preporučuje upotreba leka Tyrosur Gel tokom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato da li se tirotricin ili cetilpiridinijum-hlorid izlučuju u majčino mleko. Zbog toga se ne preporučuje

čuje upotreba leka Tyrosur Gel u periodu dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu potrebne posebne mere opreza prilikom upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Tyrosur Gel sadrži propilenglikol

Lek Tyrosur Gel sadrži propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože.

3. KAKO SE PRIMENJUJE LEK TYROSUR GEL

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Tyrosur Gel je namenjen za odrasle osobe i decu uzrasta od 1 godine i stariju.

Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena je sledeća doza za odrasle i decu:

Lek Tyrosur Gel se nanosi 2-3 puta dnevno u dovoljnoj količini da potpuno prekrije povređene delove kože.

Kod manjih rana ili zapaljenja kože na otkrivenim delovima tela, upotreba zavoja nije neophodna. U slučaju većih rana ili jako vlažnih rana, preporučuje se upotreba zaštitnog zavoja, kojeg treba menjati nakon 1-2 dana ili prema uputstvu lekara.

Način primene:

Za spoljašnju primenu na kožu. Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija. U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, morate se obratiti lekaru.



Ako mislite da je dejstvo leka suviše jako ili suviše slabo, odmah se obratite lekaru.

Ako ste primenili više leka Tyrosur Gel nego što treba

Ne očekuju se nikakve posledice. Nastavite sa lečenjem kao što je prethodno navedeno. Ako su, uprkos tome, prisutni neuobičajeni simptomi, obratite se svom lekaru.

Ako ste zaboravili da primenite lek Tyrosur Gel

Nastavite sa lečenjem kao što je prethodno navedeno. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Tyrosur Gel

Ukoliko prekinete lečenje lekom Tyrosur Gel, nećete postići željeno terapijsko dejstvo. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Veoma retka neželjena dejstva

(mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
reakcije preosetljivosti kao što je osećaj pečenja kože.

Ukoliko se kod Vas razvije reakcija preosetljivosti, treba da odmah prekinete upotrebu leka Tyrosur Gel i obratite se svom lekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjenu reakciju možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS): Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK TYROSUR GEL

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Tyrosur Gel posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i na tubi, nakon oznake „Važi do“.
Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: lek se može upotrebljavati najduže 6 meseci.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. SADRŽAJ PAKOVANJA I OSTALE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Tyrosur Gel

Aktivna supstanca je tirotricin.

Jedan gram gela sadrži 1 mg tirotricina. Pomoćne supstance su: cetilpiridinijum-hlorid; propilenglikol; etanol (96%); karbomer; trometamol; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Tyrosur Gel i sadržaj pakovanja

Gel. Bezbojan, opalescentni, viskozni gel za spoljašnju primenu.

Tyrosur Gel, 1 mg/g, gel, (1 x 5 g):

Unutrašnje pakovanje leka je cilindrična aluminijumska tuba sa kratkim ili dugim nastavkom za aplikaciju i sa belim polietilenskim zatvaračem. Tuba sadrži 5 g gela. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tuba sa 5 g gela i Uputstvo za lek.

Tyrosur Gel, 1 mg/g, gel, (1 x 15 g):

Unutrašnje pakovanje leka je cilindrična aluminijumska tuba sa belim polietilenskim zatvaračem. Tuba

sadrži 15 g gela. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu tubu sa 15 g gela i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: SALVEO DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 3V, sprat 7, Beograd - Novi Beograd
Proizvođač: ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, Herzbergstrasse 3, Niederdorfelden, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2024.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Tyrosur Gel, 1 mg/g, gel, (1 x 5g):
000456515 2023 od 20.08.2024.

Tyrosur Gel, 1 mg/g, gel, (1 x 15g):
000456517 2023 od 20.08.2024.

