

# Tyrosur® Powder

Tyrosur® Powder, 1 mg/g, prašak za kožu  
tirotricin

**Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.**

- Uvek primenjujite ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut ili medicinska sestra.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
  - Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
  - Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
  - Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

**U ovom uputstvu pročit ćete:**

- 1. ŠTA JE LEK TYROSUR POWDER I ČEMU JE NAMENJEN**
- 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO PRIMENITE LEK TYROSUR POWDER**
- 3. KAKO SE PRIMENJUJE LEK TYROSUR POWDER**
- 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA**
- 5. KAKO ČUVATI LEK TYROSUR POWDER**
- 6. SADRŽAJ PAKOVANJA I OSTALE INFORMACIJE**

.....

### **1. ŠTA JE LEK TYROSUR POWDER I ČEMU JE NAMENJEN**

Lek Tyrosur Powder sadrži aktivnu supstancu tirotricin koja pripada grupi antibiotika za lokalnu primenu. Lek Tyrosur Powder se koristi za lečenje malih površinskih i relativno vlažnih rana kao što su razderotine, ogrebotine i oderotine, sa prisutnom superinfekcijom izazvanom bakterijskim uzročnicima osetljivim na tirotricin.

.....

### **2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO PRIMENITE LEK TYROSUR POWDER**

**Lek Tyrosur Powder ne smete primenjivati:**

- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na tirotricin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

### **Upozorenja i mere opreza**

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Tyrosur Powder.

### **Drugi lekovi i lek Tyrosur Powder**

*Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.*

Uticaj drugih lekova na dejstvo leka Tyrosur Powder nije poznat. Nije poznato da lek Tyrosur Powder utiče na dejstvo bilo kog drugog leka.

### **Primena leka Tyrosur Powder sa hranom i pićima**

Nije primenljivo.

### **Trudnoća i dojenje**

#### Trudnoća

*Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.*

Nisu dostupni podaci o bezbednosti primene leka Tyrosur Powder tokom trudnoće. Nije poznato u kojoj meri tirotricin, aktivna supstanca leka, prolazi kroz kožu i ulazi u krvotok. Ako ste trudni, lek Tyrosur Powder treba da koristite samo:

- kratko vreme,
- na maloj površini,

- i samo po preporuci lekara.

#### Dojenje

Nije poznato da li se tirotricin, aktivna supstanca leka, izlučuje u majčino mleko. Ukoliko dojite, nemojte stavljati lek Tyrosur Powder na dojke i trebalo bi da ga koristite samo:

- kratko vreme,
- na maloj površini,
- i samo po preporuci lekara.

Vodite računa da Vaša beba ne dođe u kontakt sa tretiranim delovima kože.

### **Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama**

Nisu potrebne posebne mere opreza prilikom upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

.....

### **3. KAKO SE PRIMENJUJE LEK TYROSUR POWDER**

*Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.*

Lek Tyrosur Powder je namenjen za odrasle osobe i decu uzrasta od 1 godine i stariju.

Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena je sledeća doza za odrasle i decu:

Lek Tyrosur Powder treba lagano posuti 1-2 puta dnevno u tankom sloju da prekrije povređene delove kože i ukoliko je potrebno, prekriti zavojem.





#### Način primene:

Za spoljašnju primenu na kožu.

Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija. U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, morate se obratiti lekaru.

*Ako mislite da je dejstvo leka suviše jako ili suviše slabo, odmah se obratite lekaru.*

#### **Ako ste primenili više leka Tyrosur Powder nego što treba**

Ne očekuju se nikakve posledice. Nastavite sa lečenjem kao što je prethodno navedeno. Ako su, uprkos tome, prisutni neuobičajeni simptomi, obratite se svom lekaru.

#### **Ako ste zaboravili da primenite lek Tyrosur Powder**

Nastavite sa lečenjem kao što je prethodno navedeno. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

#### **Ako naglo prestanete da primenjujete lek Tyrosur Powder**

Trajanje lečenja zavisi od ozbiljnosti i kliničke slike. Ukoliko prekinete lečenje lekom Tyrosur Powder, neće te postići željeno terapijsko dejstvo.

*Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.*

#### **4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA**

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

#### **Veoma retka neželjena dejstva**

(mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

reakcije preosetljivosti.

Ukoliko se kod Vas razvije reakcija preosetljivosti, treba odmah da prekinete upotrebu leka Tyrosur Powder i obratite se svom lekaru.

#### Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta, ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavlivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS): Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija website: [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) e-mail: [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)

#### **5. KAKO ČUVATI LEK TYROSUR POWDER**

##### **➔ Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.**

Ne smete koristiti lek Tyrosur Powder posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i na bočici nakon oznake „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi od 25°C. Nakon upotrebe dobro zatvoriti bočicu. Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju baciti u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

#### **6. SADRŽAJ PAKOVANJA I OSTALE INFORMACIJE**

##### **Šta sadrži lek Tyrosur Powder**

Aktivna supstanca je tirotricin.

Jedan gram praška sadrži 1 mg tirotricina.

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; makrogol 6000; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

##### **Kako izgleda lek Tyrosur Powder i sadržaj pakovanja**

Prašak za kožu. Beli prašak.

Unutrašnje pakovanje leka je bela neprovidna polietilenska bočica (HDPE) sa bezbojnim polietilenskim perfori-

ranim čepom (LDPE) i belim polietilenskim zatvaračem (HDPE). Bočica sadrži 5 g praška.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa 5 g praška i Uputstvo za lek.

##### **Nosilac dozvole i proizvođač**

###### Nosilac dozvole:

SALVEO DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 3V, sprat 7, Beograd - Novi Beograd

###### Proizvođač:

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, Herzbergstrasse 3, Niederdorfelden, Nemačka

##### **Ovo uputstvo je poslednji put odobreno**

Av gust, 2024.

##### **Režim izdavanja leka:**

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

##### **Broj i datum dozvole:**

000454937 2023 od 20.08.2024.



ENGELHARD

Stand: 10/24; PB1707003